

PHOSTOXIN RT

Générateur de phosphine. Insecticide pour le traitement des céréales
et des locaux destinés au stockage des céréales.
AMM n° 9500323 (Detia Degesch)

1°) FORMULATION

Comprimés de 3 grammes contenant 56% de phosphore d'aluminium.

Le phosphore d'aluminium dégage de l'hydrogène phosphoré au contact de l'humidité de l'air, après exposition à l'atmosphère et selon les conditions de température et d'hygrométrie.

2°) PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Apparence : comprimés solides

Couleur : blanc

Odeur : ail

3°) USAGES HOMOLOGUÉS

Le PHOSTOXIN RT est homologué en France auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche sous le n° d'AMM 9500323 pour les usages suivants :

- Désinsectisation par fumigation des locaux de stockage des produits d'origine végétale (POV).
- Désinsectisation par fumigation des produits récoltés

4°) MODE D'EMPLOI

Locaux de stockage de POV :

Vérifier l'étanchéité du local à traiter (l'ut. Utiliser les pilules à raison de 15 grammes par m³. L'utilisation d'un appareil de mesure ou de tubes colorimétrique est indispensable pour vérifier que la concentration optimale est atteinte dans le local à désinsectiser.

Traitement des céréales et des produits récoltés :

La dose et la durée du traitement dépend de la nature des produits à traiter et de la température au moment du traitement.

A titre indicatif :

Grains stockés en vrac (ex. blé) : 2 à 4 comprimés par tonne

Céréales stockées en sacs en piles : 2 à 3 comprimés par m³

Tabac : 1 à 1,5 comprimé par m³


Autres denrées stockées en sacs : 2 à 3 comprimés par m³

Durée du traitement :

À 15-20°C : 7 jours

À 21-25°C : 5 jours

À 26°C et plus : 4 jours



PHOSTOXIN RT

Générateur de phosphine. Insecticide pour le traitement des céréales et des locaux destinés au stockage des céréales.

AMM n° 9500323 (Detia Degesch)

5°) PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas ouvrir en extérieur par temps de pluie. Ne jamais mettre en contact avec de l'eau.

Ventiler à fond avant de réoccuper les locaux. Bien que le phosphore d'hydrogène se disperse rapidement, s'assurer que la concentration a atteint 0,1 ppm avant de rentrer dans les locaux traités (délai minimum de réentrée : 8 heures).

En cas d'exposition (ex. pour aller ventiler un local traité), porter un équipement de protection approprié (vêtement, masque...etc.)

6°) CONDITIONNEMENT

Flacons de 1Kg (soit 333 comprimés de 3 grammes chacun)

Cartons de 22 flacons de 1Kg

7°) AUTRES PRÉCAUTIONS

Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Évacuer les personnes, les animaux et les denrées alimentaires des locaux à traiter.

Soyez prudent, PHOSTOXIN RT réagit violemment au contact de l'eau (risque d'inflammation très brutale).

Ce produit ne peut être vendu en France qu'à des professionnels agréés par le Service de la Protection des Végétaux. Respecter les distances de sécurité vis-à-vis de tout bâtiment.